

## Výsledky pozorování za období červenec 2020

<b>BŘECLAVSKO</b>	<b>Datum</b>	<b>Situace na lokalitě</b>	<b>Výskyt komárů</b>	<b>Stupeň nebezpečí</b>
<i>Horní les, Kančí obora</i>	14. 7.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí i v rezervaci Křivé jezero jsou líhniště vyschlá.	Komáři dokončili svůj vývoj, aktivita samiček dosahuje vrcholu. Výskyt komárů má v lužních lesích místy, zvláště v blízkosti líhnišť charakter kalamity. Na mnoha místech je vysoký výskyt muchniček. V blízkosti lesů je třeba použít repelenty, doporučuje se omezit pobyt v lužních lesích	Lokálně kalamita
<i>Polesí Lanžhot</i>	14. 7.	Líhniště jsou vyschlá.	Komáři dokončili svůj vývoj, aktivita samiček dosahuje vrcholu. Výskyt komárů má místy, charakter kalamity. Nejvyšší výskyt je v blízkosti soutoku Moravy a Dyje a podél hranic s Rakouskem. Při návštěvě této oblasti je nutné použít repelenty a omezit pobyt na jednom místě. Doporučuje se pohybovat se v otevřeném terénu a vyhýbat se porostu. Pobyt v lese omezit na dopolední a polední hodiny.	Lokálně kalamita
<i>Polesí Tvrdonice</i>	14.7.	Periodické tůně jsou vyschlé	Komáři dokončili svůj vývoj, aktivita samiček dosahuje vrcholu. Výskyt komárů má v lužních lesích místy, zvláště v blízkosti líhnišť charakter kalamity	Lokálně kalamita
<i>Polesí Vranovice</i>	15.7.	Periodické tůně jsou vyschlé	Komáři dokončili svůj vývoj, aktivita samiček dosahuje vrcholu. Výskyt komárů má v lužních lesích místy, zvláště v blízkosti líhnišť charakter kalamity	+++
<b>HODONÍNSKO</b>				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	14. 7.	Líhniště komárů jsou vyschlá	Komáři dokončili svůj vývoj, aktivita samiček dosahuje vrcholu. Výskyt komárů má v lužním lese charakter kalamity. Při návštěvě přístaviště a okolí je nutné použít repelenty a omezit pobyt v lese.	Lokální kalamita
<i>Celé území</i>	Červenec - srpen	Nádrže se zadržovanou dešťovou vodou	V těchto nádobách dochází k masivnímu líhnutí komára pisklavého, který může ve večerních a nočních hodinách obtěžovat občany zvláště na zahradách a jiných místech s větším množstvím zeleně. Může rovněž zaletovat do bytů.	

			<p>Tento komár je schopen přenášet virus západonilské horečky. I když se toto onemocnění u nás vyskytuje zcela ojediněle, je třeba se před tímto komárem chránit – ochrana obydlí, osobní repelenty. Menší plochy lze ošetřit prostorovými (3D) repelenty ředitelnými vodou (označené jako koncentrát). Prostorové repelenty se prodávají i ve formě spreje k přímému použití, ty se však nesmějí stříkat přímo na vegetaci.</p>	
--	--	--	--	--

*Vysvětlivky:*

*0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný*

*+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí*

*++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost*

*+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo*

*kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo*