

, Výsledky pozorování za období září 2021

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
Území celého Jihomoravského kraje	Září	Lužní lesy	V posledních dnech i nadále dochází k výraznému snížení počtu aktivních dospělců komárů. I v lesích se objevují aktivní dospělci rodu Culex. Stále doporučujeme před vstupem do lesa použít repelentní přípravky.	
	Podzim	Nádoby na zadržování dešťové vody	<p>V nádobách s vodou i během teplých podzimních dnů dochází k líhnutí komára pisklavého, který může obtěžovat zejména ve večerních a nočních hodinách na zahradách a jiných místech s větším množstvím zeleně.</p> <p>Se snižováním teploty vzduchu lze očekávat zvýšenou intenzitu vletů komára pisklavého do obydlí, jeho zvýšenou aktivitu v obytných místnostech a obtěžování, zejména během noci. Doporučujeme zabezpečit obydlí proti náletům tohoto komára. Tento komár je schopen přenášet virus západonilské horečky.</p> <p>Přestože se toto onemocnění na našem území vyskytuje zcela ojediněle, je třeba se před tímto druhem komára chránit. Nutná je ochrana obydlí a při pobytu na zahradě či v přírodě použití osobní repelentů. Menší plochy lze ošetřit prostorovými (3D) repelenty. Snížit pravděpodobnost líhnutí tohoto komára lze též uzavřením nádob s vodou.</p>	

BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	17. 9.	Lokality Kančí obora, obora Obelisk a NPR Křivé jezero jsou na většině území vyschlé.	V Kančí oboře došlo v posledních 14 dnech k nárůstu počtu aktivních dospělců komárů. Tento nárůst však není nijak vysoký. V NPR Křivé jezero se aktivní dospělci komárů vyskytují jen v malém množství. Výskyt muchniček nebyl na lokalitách zaznamenán. Dominantním je na obou lokalitách stále druh Ae. vexans.	++
<i>Polesí Lanžhot</i>	17. 9.	Oblast je nyní na většině území vyschlá.	V oblasti okolí Pohanska je výskyt aktivních dospělců komárů velmi nízký. V oblasti soutoku řek Moravy a Dyje se v posledním měsíci aktivní dospělci komárů vyskytují také pouze v malém množství. Dospělci komárů patří stále převážně k druhu Ae. vexans. Aktivní dospělci muchniček se ve velmi malém množství vyskytují na Pohansku i v oblasti soutoku.	++
<i>Polesí Tvrdonice</i>	17. 9.	Oblast je nyní na většině území vyschlá.	V lese v blízkosti obce Tvrdonice byl zaznamenán velmi malý výskyt dospělců kalamitních druhů komárů, zejména druhu Ae. vexans. Výskyt aktivních muchniček nebyl zaznamenán.	++
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín – Loděnice</i>	11. 8.	Po vydatných srážkách v posledním týdnu je půda mokrá, stojící voda se však na lokalitě nevyskytuje. Líhniště komárů je vyschlé.	V lese poblíž přístaviště se vyskytují aktivní dospělci komárů v malém množství.	++

MVDr. Michaela Němečková, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

- 0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí
++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo