

PŘÍPRAVA NA SEZÓNU KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY: NA PREVENCI MYSLETE VČAS

Klíšťová encefalitida je nejzávažnějším onemocněním přenášeným u nás klíšťaty. Postihuje centrální i periferní nervový systém, s rizikem trvalých následků. Závažnost průběhu onemocnění a následků stoupá s věkem.


Jihomoravský kraj patří k regionům s vyšším rizikem. K významným přírodním ohniskům klíšťové encefalidity nepatří jen přírodní lokality a rekreační oblasti, ale i městské parky.

Pro onemocnění je charakteristická sezónnost související s aktivitou klíšťat a počasím (teplota vzduchu, vlhkost). První případy se objevují již v jarních měsících.


Zimní období je nejvhodnější dobou k přípravě na další sezónu – tedy pro zahájení očkování, případně ke kontrole očkování dosavadního a realizaci potřebného přeočkování.

Přestože je očkování k dispozici již mnoho let, není využíváno dostatečně a počet případů tak neubývá. Jedná se o zbytečná onemocnění, kterým bylo možné včas předejít.

Počty případů klíšťové encefalidity v Jihomoravském kraji (2001-2022)



Sezonalita klíšťové encefalidity v Jihomoravském kraji v uplynulých 5 letech



Prevence:

Očkování proti klíšťové encefalitidě bylo v ČR zahájeno již v roce 1990. Proočkovanosť v ČR je však na rozdíl od jiných exponovaných zemí stále na velmi nízké úrovni. Patří mezi **očkování nepovinná, prováděná na žádost**. Očkování provádějí praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center.

Závažnost onemocnění a riziko trvalých následků souvisí zejména **s vyšším věkem**. Toto zohledňují zdravotní pojišťovny, které **od roku 2022 osobám starším 50 let očkování hradí**. Ostatním na očkování přispívají formou benefitů.

Ochranná imunita proti onemocnění vzniká až po 2. dávce očkování, která je podána v odstupu 1-3 měsíců po podání 1. dávky. Pro prevenci je proto klíčové **zahájit očkování včas**.

*MUDr. Renata Ciupek, protiepidemický odbor KHS Jihomoravského kraje
Brno, 19.01.2023*