


KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA V JIHMORAVSKÉM KRAJI


NEPODCEŇUJTE PREVENCI

Jihomoravský kraj patří k regionům s vyšším rizikem nákazy virem klíšťové encefalitidy. K oblastem s vyšším rizikem nákazy patří přírodní lokality a rekreační oblasti, ale i městské parky. Pro onemocnění je charakteristická **sezónnost související s aktivitou přenašečů – klíšťat**, která je závislá na počasí (teplota vzduchu, vlhkost). První případy se objevují již v jarních měsících, poslední na konci sezóny – zpravidla v listopadu.

Počty případů klíšťové encefalitidy v Jihomoravském kraji (2001-2022)



Sezonalita klíšťové encefalitidy v Jihomoravském kraji v uplynulých 5 letech



Klíšťová encefalitida je nejzávažnějším onemocněním přenášeným u nás klíšťaty. Postihuje centrální i periferní nervový systém, s rizikem trvalých následků. Závažnost průběhu onemocnění a následků stoupá s věkem.

Od začátku sezóny v roce 2023 do 31. července 2023 je v Jihomoravském kraji potvrzeno 14 případů.

Prevence:

Jedinou účinnou prevencí je očkování. Závažnost onemocnění a riziko trvalých následků zohledňují zdravotní pojišťovny, které **od roku 2022 osobám starším 50 let očkování plně hradí**. Ostatním osobám na očkování přispívají formou benefitů. Očkuje se i v sezóně, za použití **zrychleného schématu**.

MUDr. Renata Ciupek, protiepidemický odbor KHS Jihomoravského kraje
Brno, 31.07.2023