

Výsledky pozorování za období červen 2025

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	20. 6.	Většina tůní je vyschlá.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí je pozorována zvýšená aktivita samiček, která je však na úrovni pro tuto oblast obvyklou. Dominantním druhem je <i>Aedes sticticus</i> . Při delším pobytu je nutné použít repelenty. Zvýšený výskyt komárů lze očekávat i v přilehlých obcích, především v některých částech Břeclavi a Lednice. V rezervaci Křivé jezero je výskyt obvyklý pro tuto dobu, dominantními druhy jsou <i>Ae. vexans</i> a <i>Ae. cantans</i> s. l.	++
<i>Lednické rybníky</i>	20.6.	Hladina Mlýnského rybníka je poměrně vysoká	Na březích rybníků byl zjištěn zvýšený výskyt komárů. Dominantním druhem je <i>Culex modestus</i> . Tento druh se zdržuje jev v bezprostřední blízkosti rybníků a člověka napadá, především v pozdních odpoledních hodinách. V oblasti v blízkosti lesa je pravděpodobné zalétávání komárů z této oblasti (viz Kančí obora). Při delším pobytu je vhodné použít vhodný repelent.	++
<i>Polesí Lanžhot</i>	20. 6	V oblasti se neobvyklé sucho, nacházejí se zde jen izolované periodické tůně, ve kterých jsou obvykle zbytky starší voda.	Aktivita komárů je v celé oblasti nižší, než je v tomto období obvyklé, v blízkosti zámečku Pohansko velmi nízká. Dominantním druhem je <i>Aedes vexans</i> . Na mnoha místech, především v blízkosti zámečku Pohansko je zvýšený výskyt muchniček, které jsou aktivní zejména ve dne. Při delším pobytu doporučeno použít repelenty.	+
<i>Polesí Tvrdonice</i>	20. 6.	V polesí Tvrdonice jsou periodické tůně vesměs vyschlé.	Aktivita samiček komárů je zatím spíše podprůměrná. Dominantní druhem je <i>Aedes sticticus</i> .	+
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	13. 6.	Periodické tůně jsou vyschlé.	Aktivita komárů je přes den nízká.	+
CELÉ ÚZEMÍ		Aktivita komárů dosáhla vrcholu a lokálně může být zvýšená. Nikde však nepřekračuje úroveň pro tuto oblast obvyklou. Na zahradách je třeba věnovat zvýšenou pozornost <u>nádobám s dešťovou vodou a bazénům, kde často dochází k masivnímu vývoji komárů.</u> Pokud se zde larvy objeví, je nutné vodu vylít, nebo urychleně použít. Barely je dobré rovněž zakrývat.	Pokud nenastanou výrazné srážky, pak se v následujícím období nebude příliš měnit a bude závislá na vývoji počasí. Dominantními druhy jsou <i>Aedes sticticus</i> a <i>Aedes vexans</i> . Jedná se o druhy, který člověka intenzivně napadají, zvláště za vlhkého počasí a jsou aktivní především ve dne. V blízkosti zahrádkářských kolonií je třeba počítat se zvýšeným výskytem komára pisklavého (<i>Culex pipiens</i>), který se vyvíjí v barelech s vodou a bazénech. Tento komár je aktivní především v době kolem západu slunce a večer a často zaletuje do bytů. Na člověku saje zřídka, ale svými projevy obtěžuje.	++

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Výsvětlivky:

0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí
++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo