

Výsledky pozorování za období červenec 2025

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	22. 7.	Tůně jsou vyschlé.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí je vysoká aktivita komárů, v oblasti pod Novomlýnskými nádržemi je aktivita zvýšená, nepřekračuje ale obvyklou úroveň. Dominantními druhy jsou <i>Aedes vexans</i> a <i>Ae. sticticus</i> . V případě delšího pobytu a nižší pohybové aktivity se doporučuje použití repelentních přípravků.	++
<i>Lednické rybníky</i>	22. 7.	Hladina Mlýnského rybníka je poměrně vysoká	Na březích rybníků byl zjištěn zvýšený výskyt komárů. Dominantním druhem je <i>Culex modestus</i> . Tento druh se zdržuje jev v bezprostřední blízkosti rybníků a člověka napadá, především v pozdních odpoledních hodinách. V oblasti v blízkosti lesa je pravděpodobné zalétávání komárů z této oblasti (viz Kančí obora). Při delším pobytu je vhodné použít vhodný repelent.	++
<i>Polesí Lanžhot</i>	22. 7	V oblasti se neobvyklé sucho, nacházejí se zde jen izolované periodické tůně, ve kterých jsou obvykle zbytky starší voda.	Aktivita komárů je v celé oblasti neobvykle nízká. Dominantním druhem je <i>Aedes vexans</i> . Na mnoha místech, především v blízkosti zámečku Pohansko je vysoký výskyt muchniček, které jsou aktivní především ve dne. Při delším pobytu se doporučuje použít repelenty.	+
<i>Polesí Tvrdonice</i>	22. 7.	V polesí Tvrdonice jsou periodické tůně vesměs vyschlé.	Aktivita samic komárů je nižší, než je v této oblasti obvyklé. Dominantním druhem je <i>Aedes vexans</i> .	+
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	21. 7.	Periodické tůně jsou vyschlé.	Aktivita komárů je přes den nízká.	+
CELÉ ÚZEMÍ		Aktivita komárů dosáhla vrcholu a lokálně může být zvýšená. Nikde však nepřekračuje úroveň pro tuto oblast obvyklou. Na zahradách je třeba věnovat zvýšenou pozornost nádobám s dešťovou vodou a bazénům, kde často dochází k masivnímu vývoji komárů. Pokud se zde larvy objeví, je nutné vodu vylít, nebo urychleně použít. Barely je dobré rovněž zakrývat.	Pokud nenastanou výrazné srážky, pak se v následujícím období nebude aktivita komárů příliš měnit a bude závislá na vývoji počasí. Dominantními druhy jsou <i>Aedes vexans</i> a <i>Aedes sticticus</i> . Jedná se o druhy, který člověka intenzivně napadají, zvláště za vlhkého počasí a jsou aktivní především ve dne. V oblasti Lednických rybníků je dominantním druhem <i>Culex modestus</i> . V blízkosti zahrádkářských kolonií je třeba počítat se zvýšeným výskytem komára pisklavého (<i>Culex pipiens</i>), který se vyvíjí v barelech s vodou a bazénech. Tento komár je aktivní především v době kolem západu slunce a večer a často zaletuje do bytů. Na člověku saje zřídka, ale svými projevy obtěžuje.	

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

- 0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
- + vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí
- ++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
- +++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
- kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo