

Výsledky pozorování za období srpen 2025

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	13. 8.	Tůně jsou vyschlé.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí aktivita komárů klesla a je na nízké. Nízká aktivita komárů byla zaznamenána rovněž v oblasti pod Novomlýnskými nádržemi. Dominantními druhy jsou <i>Aedes vexans</i> a <i>Ae. sticticus</i> . V případě delšího pobytu a nižší pohybové aktivity se doporučuje použití repelentních přípravků.	+
<i>Lednické rybníky</i>	13.8.	Hladina Mlýnského rybníka je poměrně vysoká	Na březích rybníků aktivita komárů klesla a je průměrná. Dominantními druhy jsou <i>Culex modestus</i> a <i>Anopheles maculipennis</i> s. l. V části ležící v blízkosti lesa je pravděpodobné zalétávání komárů z této oblasti (viz Kančí obora). Při delším pobytu je vhodné použít vhodný repelent.	+
<i>Polesí Lanžhot</i>	13. 8	V oblasti se neobvyklé sucho, nacházejí se zde jen izolované periodické tůně, ve kterých jsou obvykle zbytky starší voda.	Aktivita komárů je v celé oblasti neobvykle nízká. Dominantním druhem je <i>Aedes vexans</i> . Na mnoha místech, především v blízkosti zámečku Pohansko je vysoký výskyt muchniček, které jsou aktivní především ve dne. Při delším pobytu se doporučuje použít repelenty.	+
<i>Polesí Tvrdonice</i>	13. 8.	V polesí Tvrdonice jsou periodické tůně vesměs vyschlé.	Aktivita samiček komárů je nižší, než je v této oblasti obvyklé. Dominantním druhem je <i>Aedes vexans</i> .	+
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	13. 8.	Periodické tůně jsou vyschlé.	Aktivita komárů je přes den nízká.	+
CELÉ ÚZEMÍ		Aktivita komárů v okolí lužních lesů a rybníků pozvolna klesá a pokud nedojde k novému zaplavení líhnišť bude klesat i nadále. Na zahradách je třeba věnovat zvýšenou pozornost nádobám s dešťovou vodou a bazénům, kde často dochází k masivnímu vývoji komárů. Pokud se zde larvy objeví, je nutné vodu vylít, nebo urychleně použít. Barely je dobré rovněž zakrývat.	Pokud nenastanou výrazné srážky, pak bude v následujícím období aktivita komárů nadále klesat a bude záviset na počasí. Dominantními druhy jsou <i>Aedes vexans</i> a <i>Aedes sticticus</i> . Jedná se o druhy, které člověka intenzivně napadají, zvláště za vlhkého počasí a jsou aktivní především ve dne. V oblasti Lednických rybníků je dominantním druhem <i>Culex modestus</i> . V blízkosti zahrádkářských kolonií je třeba počítat se zvýšeným výskytem komára pisklavého (<i>Culex pipiens</i>), který se vyvíjí v barelech s vodou a v bazénech. Tento komár je aktivní především v době kolem západu slunce a večer a často zaletuje do bytů. Na člověku sají zřídka, ale svými projevy ho obtěžuje. V oboře Soutok, zvláště v blízkosti zámečku Pohansko, je vysoký výskyt muchniček	

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

- 0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
- + vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí
- ++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
- +++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
- kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo