

Tisková konference

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně



Brno, 08.10.2026

- **aktuální výskyt virové hepatitidy A (VHA) v Jihomoravském kraji**
- **situace v oblasti klíšťové encefalitidy a možnosti prevence**
- **příprava na nadcházející chřipkovou sezónu**

**Virová hepatitida A:
problém trvá**



Hepatitida A v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj 01.01.-30.09.2026



Hepatitida A – případy dle věku a profese

Jihomoravský kraj, 01.01.-30.09.2026



Opatření k zabránění šíření

- včasná diagnostika, izolace nemocného (infekční oddělení) a léčba
- **aktivní vyhledávání osob v kontaktu s nemocným**, jejich vyšetření a sledování jejich zdravotního stavu
- **pracovníci v potravinářství jsou vyřazeni z provozu**
- ochrana osob v rizikovém kontaktu vakcinací (po-expoziční), k zabránění rozvoje onemocnění – úspěšnost 98 %
- zostřený dezinfekční režim
- všechna prováděná opatření jsou stanovena legislativou ČR *)

Situace v Jihomoravském kraji v období 01.01.-30.09.2026:

- řešeno 2924 osob v rizikovém kontaktu s nemocným (rozpětí 1-52 osob k jednomu případu)

*) Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška č. 306/2012 Sb., Vyhláška č. 389/2023 Sb.

Doporučení epidemiologů

Na základě praktických zkušeností z nedávných epidemií i z epidemie současné:

- **apel na preventivní očkování proti hepatitidě A:**
 - **pracovníkům v gastronomii – zejména školní a nemocniční kuchyně, kuchyně pobytových zařízení sociálních služeb**
 - **studentům v přípravě na gastronomické obory**
 - **osobám profesně činným v sociálních službách terénního charakteru a dalším obdobně exponovaným pracovníkům**

Pokud onemocní, nebo byli v kontaktu s nemocným, nemohou pracovat a jsou z provozu vyřazeni na týdny. Může dojít k ohrožení poskytování služeb!


Hepatitida A – infekční žloutenka

- akutní virové zánětlivé onemocnění jater
- virus vniká do těla ústy, infikovaná osoba vylučuje virus stolicí
- virus je **velmi odolný v prostředí, odolává mrazu**
- jedná se o **výhradně lidské onemocnění**
- inkubační doba je 14-50 dnů
- k přenosu dochází:
 - mezilidským kontaktem (rukama) – fekálně–orální přenos
 - prostřednictvím předmětů a kontaktních míst (madla, kliky...), neomytým ovocem a zeleninou
 - intimními praktikami

**Klíšťová encefalitida:
sezóna nekončí**

Případy klíšové encefalitidy v průběhu roku

Česká republika, 2018-2026* (k 30.09.2026-nekompletní data)





Sezóna zvýšeného rizika
na podzim pokračuje

Aktivita klíšťat závisí na
počasí – teplota při zemi,
vlhkost vzduchu

Riziko onemocnění závisí
na aktivitě lidí (procházky,
houbaření, sport), na jejich
ochraně a zejména jejich
očkování

Kde jsou rizika?

- ve všech krajích ČR, travnaté porosty a křoviny, **včetně městských parků a zahrad**
- riziko ze **syrového mléka** (bez tepelné úpravy nebo pasterizace)
- při **nesprávné manipulaci** s klíštětem při jeho odstraňování
- promořenost klíšťat virem KE kolísá mezi 1-5 %
- **specifická antivirová léčba není k dispozici**
- **k přenosu viru stačí 10 minut od přisátí**




Klíště.cz, dostupné na <https://www.kliste.cz/cz/vse-o-klistatech/clanek/vyskyt-infikovanych-klisat-v-jednotlivych-letech>, staženo 28.2.2026;

<https://depositphotos.com/cz/vectors/cartoon-lawn-mower.html>

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zacala-sezona-klisat-lide-uz-posilaji-prvni-do-laboratori.A110404_154247_domaci_hv; staženo 18.09.2026; Klíště.cz, dostupné na <https://www.kliste.cz/cz/vse-o-klistatech/clanek/vyskyt-infikovanych-klisat-v-jednotlivych-letech>, staženo 19.09.2026; <https://depositphotos.com/cz/vectors/cartoon-lawn-mower.html>; Biometeorologická předpověď, ČHMÚ, dostupné na

Případy klíčové encefalitidy dle věku


Česká republika, 2018-2026* (k 30.09.2026-nekompletní data)



Máme očkování! Jak je využíváno?




- klíšťová encefalitida je **snadno preventabilní onemocnění**
- pro děti s podporou **preventivních programů zdravotních pojišťoven**, pro dospělé nad 50 let plně hrazeno
- nutné je **dodržení předepsaného očkovacího schématu**
- očkovat lze **celoročně**



Vývoj počtů případů klíšové encefalitidy

Česká republika, 1997-2026* (k 30.09.2026-nekompletní data)




Faktory ovlivňující riziko nákazy:

- aktivita klíšťat
- aktivita lidí v přírodě
- přemnožení hlodavců
- počasí – vlhkost
- teplota od +5 až +7°C při zemi
- nespecifická prevence
- proočkovanost

**Sezóna
respiračních infekcí a chřipky
je před námi**


Aktuální vývoj výskytu respiračních infekcí

Jihomoravský kraj, porovnání sezón




Aktivita respiračních virů ve většině zemí včetně ČR zůstává na mimosezónní úrovni.

Aktuálně detekovány rhinoviry (76 %), viry parainfluenzy (8 %) a SARS-CoV-2 (5 %).



Zdroj: ISIN, registr ARI



Legenda: A – Influenza A; B – Influenza B; HRSV – Respirační syncytiální virus; HAdV – Adenovirus; HPIV – Parainfluenza; HV – Herpetické viry; MP – Mycoplasma; HMPV – Metapneumovirus; CoV – Coronavirus; HRV – Rhinovirus; hBoV – Bocavirus; EV – Enterovirus; SM – Smíšená infekce

Chřipka je závažné a komplexní onemocnění

Způsobuje **každoročně** epidemie

Virus **často mění svoje vlastnosti**, vrací se v **pozměněné podobě**

Imunita typově a kmenově **specifická**, ochranné **protilátky** přetrvávají **řádově pouze v měsících**

Chřipka je provázena **komplikacemi**, především u starších osob a malých dětí. Zhoršuje průběh kardiologického onemocnění

Očkování je vhodné **od začátku dostupnosti vakcíny** až po začátek chřipkové epidemie

Chřipka je celosvětově zdravotní, sociální a ekonomický problém

Hledejte v navigaci...



-  Úvod
-  Ministerstvo zdravotnictví
 - Úřední deska 
 - Kariéra na ministerstvu 
-  Informace dostupné dálkovým přístupem
-  Tiskové centrum
-  Agendy ministerstva
-  Dotace a programové financování
-  Evropské fondy
-  Informace ke covidu-19
-  Mezinárodní vztahy a EU
-  Metodiky a stanoviska
-  Ochrana veřejného zdraví

-  Biocidy a chemické látky
-  Chřipka a respirační onemocnění v sezóně 2026/2027

[Úvod](#) > [Ochrana veřejného zdraví](#) > Chřipka a respirační onemocnění v sezóně 2026/2027

Chřipka a respirační onemocnění v sezóně 2026/2027

Informace pro praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost a další vybrané odborné společnosti s blížícím se obdobím zvýšeného výskytu respiračních infekcí

S blížícím se obdobím zvýšeného výskytu respiračních infekcí a v souvislosti s přípravou na nadcházející respirační sezónu a podporou prevence závažných průběhů respiračních onemocnění oslovil zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš [...]

 22. 9. 2026

[Celý článek »](#)

Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

Podzimní a zimní období je každoročně spojeno se zvýšeným výskytem akutních respiračních infekcí. U zranitelných skupin osob mohou mít zejména chřipka a infekce způsobené RS viry závažný průběh a vést k rozvoji komplikací.

 22. 9. 2026

[Celý článek »](#)